PROTOCOLO

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD LACASA CON EL BOTRYTEST

Requisito previo : el análisis debe ser realizado sore el mosto/vino no sulfitado

En caso contrario, el mosto/vino debe estar desulfitado antes del análisis, por adición de agua oxigenada(solución al 30 % : 150 µL/100 mL de mosto/vino).*

**Agua oxigenada no proporcionada en el kit*



1. Introducir por medio de una pipeta, 5 mL de mosto o de vino a analizar dentro de la jeringa.

2. Colocar la jeringa sobre el tubo y dejar caer hasta que la resina de dentro de la jeringa este mojada hasta la base (3-10 minutos). Introducir enseguida el pistón dentro de la jeringa y empujar ligera y lentamente Recoger el primer mililitro (justo hasta la primera marca) dentro del tubo

3. Añadir 1.4 mL de tampón (justo hasta la segunda marca) y luego 0.6 mL de reactivo « BOTRYTEST laccase » (justo hasta la tercera marca del tubo). Mezclar todo agitando el tubo

4. Después de 3 minutos (cronómetro) determinar la actividad lacasa comparando el color desarrollado con el de la escala colorimétrica

LAFFORT
l'œnologie par nature

BP 17 – 33072 BORDEAUX CEDEX – Tél. : +33 (0)5 56 86 53 04 – www.laffort.com

AS-MLM-03.02.2012 - (para ampliar la información, ver la ficha comercial del producto : www.laffort.com)