

VINIBENT® SR

Preparado específico para corregir y/o limitar las evoluciones de las características cromáticas de vinos rosados, así como los riesgos de « pinking » en algunos vinos blancos.

Apto para la elaboración de productos destinados al consumo humano directo, dentro del marco legal vigente para la enología. Conforme al Reglamento (CE) n° 2019/934.

ESPECIFICACIONES

La combinación de diferentes materias primas permite responder a varias aplicaciones preventivas y curativas.

VINIBENT® SR combina:

- Una selección de las mejores bentonitas sódicas por su capacidad de adsorción de las proteínas naturales inestables y la prevención de la oxidación del vino al adsorber las oxidasas (polifenoloxidasas).
- La PVPP pura por su acción sobre los compuestos fenólicos (catequinas y leucoantocianos) responsables en parte del pardeamiento de los vinos y por su nada despreciable acción sobre la limpidez.

PROPIEDADES ENOLÓGICAS

VINIBENT® SR:

- Mejora, preserva y estabiliza el color del vino en el tiempo.
- Preserva las cualidades organolépticas.
- Previene el riesgo de pardeamiento.
- Adsorbe selectivamente las proteínas inestables.
- Elimina las sensaciones astringentes y amargas de algunos mostos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto	polvo	Residuos de partículas gruesas (%)	< 7
Color	beige claro		

ANÁLISIS QUÍMICOS

PVPP (%)	≈ 20	Plomo (ppm)	< 5
Bentonita (%)	≈ 80	Mercurio (ppm)	< 1
Humedad (%)	< 13,5	Hierro (ppm)	< 500
Arsénico (ppm)	< 2,2		



PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN

CONDICIONES ENOLÓGICAS

- Aunque es preferible efectuar el tratamiento preventivo de los mostos durante el desfangado y justo antes de la adición de las levaduras, es posible utilizar **VINIBENT® SR** después del trasiego.

DOSIS DE EMPLEO

- En función del estado sanitario de la vendimia, de la intensidad colorante de la materia prima y del objetivo buscado: **entre 35 y 100 g/hL**.
Dosis máxima legal (UE): 479 g/hL.

MODO DE EMPLEO

Disolver **VINIBENT® SR** en 10 veces su peso en agua agitación (no prepararlo nunca directamente en el mosto o en el vino). Se recomienda dejar hinchar la solución durante 1 a 2 horas antes de su uso.

Introducir en el mosto antes de la adición de las levaduras o en el vino mezclando enérgicamente para una difusión rápida y homogénea. Se recomienda la utilización de un **OENODOSEUR** (sistema venturi) para asegurar una perfecta adición dentro del mosto.

La solución de **VINIBENT® SR** preparada debe ser utilizada el mismo día de la preparación, no se debe conservar la solución.

RECOMENDACIÓN DE CONSERVACIÓN

- Conservar fuera del suelo en su embalaje de origen, sin abrir a temperatura moderada en locales secos no susceptibles de comunicar olores.
- Fecha de utilización óptima: 4 años.

ENVASE

Bolsa de 5 kg, caja de 10 kg.

