

# ZYMAFLORE® CX9

Levure pour vins blancs (Chardonnay).

*Levure Sèche Active Sélectionnée (LSAS) non OGM, pour usage œnologique. Apte à l'élaboration de produits destinés à la consommation humaine directe, dans le cadre de l'emploi réglementé en œnologie. Conforme au Règlement CE n° 606/2009.*

## SPÉCIFICITÉS ET PROPRIÉTÉS ŒNOLOGIQUES

Levure issue d'une sélection massale sur un grand climat de Bourgogne et de la technique du breeding. ZYMAFLORE® CX9 permet de révéler des notes citronnées, d'amande et pain grillé, de noisette fraîche. Les vins s'illustrent par un équilibre subtil entre onctuosité, tension et volume en bouche.

Recommandée pour les grands Chardonnay complexes et onctueux.

### CARACTÉRISTIQUES FERMENTAIRES

- Tolérance à l'alcool : jusqu'à 16 % vol.
- Températures de fermentation (optimum) : 14 - 22°C.
- Besoins en azote faibles.
- Phase de latence courte.
- Bonne capacité fermentaire.


### CARACTÉRISTIQUES AROMATIQUES

Profil aromatique complexe et délicat:

- Souche pof(-) : ne possède pas d'activité cinnamate décarboxylase, responsable de la formation des vinyls-phénols, « masqueurs » d'arômes ou responsables de notes lourdes de type « pharmaceutique, gouache ».
- Très bonne aptitude à l'élevage sur lies (sous-bois ou en contenant inox).

## PROFIL SENSORIEL

PROFILS SENSORIELS DE VINS VINIFIÉS AVEC ZYMAFLORE® CX9 EN FONCTION DU TYPE DE VINIFICATION.



# LAFFORT

*l'œnologie par nature*

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

---

Levures déshydratées et emballées sous vide.

Aspect ..... granulats

## ANALYSES CHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES

---

Humidité (%) ..... < 8 %  
Cellules vivantes LSAS / g .....  $\geq 2.10^{10}$   
Bactéries lactiques / g ..... <  $10^5$   
Bactéries acétiques / g ..... <  $10^4$   
Levures sauvages / LSAS / g ..... <  $10^5$   
Coliformes /g ..... <  $10^2$   
*E. coli* /g ..... absence

Staphylocoques /g ..... absence  
Salmonelles/25g ..... absence  
Moisissures / g ..... <  $10^3$   
Plomb ..... < 2 ppm  
Arsenic ..... < 3 ppm  
Mercure ..... < 1 ppm  
Cadmium ..... < 1 ppm

## PROTOCOLE D'UTILISATION

---

### CONDITIONS CŒNOLOGIQUES

- Levurer le plus tôt possible après l'encuvage.
- Respecter les doses prescrites afin d'assurer une bonne implantation de la levure, même en cas de forte population de levures indigènes.
- La température, la souche de levure, la réhydratation et l'hygiène de la cave sont également primordiales pour une bonne implantation.

### DOSAGE

- 20 - 30 g/hL.

### MISE EN ŒUVRE

- Bien suivre le protocole de réhydratation de la levure.
- Eviter les différences de température supérieures à 10°C entre le moût et le levain lors de l'inoculation. Le temps total de préparation du levain ne doit pas excéder 45 minutes.
- Dans le cas de conditions particulièrement difficiles de fermentation (température très faible, moût très clarifié, TAP très élevé) et/ou pour optimiser les performances aromatiques de la levure, utiliser **SUPERSTART® BLANC** dans l'eau de réhydratation.

### CONSERVATION

---

- Conserver au frais, hors sol dans l'emballage d'origine, dans des locaux secs non susceptibles de communiquer des odeurs.
- DLUO : 4 ans.

### CONDITIONNEMENT

---

Sachet sous vide de 500g.  
Carton de 10 kg

