



ACTIFLORE® BO213

Селекционированные активные сухие дрожжи (САСД) – без ГМО, для использования в виноделии. Разрешены для применения в производстве пищевых продуктов, в рамках регламентированного использования в виноделии. Соответствуют Регламенту (ЕС) 2019/934.

ОПИСАНИЕ И ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дрожжи *Saccharomyces cerevisiae*, особенно рекомендуются для возобновления брожения. Штамм фруктофильного характера, отличающийся великолепной устойчивостью к высокому содержанию спирта и к низким температурам. ACTIFLORE® BO213 также интересны своей ароматической нейтральностью (хорошо сохраняют сортовые особенности винограда).

ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фруктофильный характер.
- Спиртоустойчивость: до 18% об.
- Температура брожения : 10- 32 °C.
- Слабая потребность в азоте.

АРОМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ароматически нейтральны (сохранение сортовых характеристик).

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обезвоженные дрожжи в вакуумной упаковке.

Форма гранулы

ХИМИЧЕСКИЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Влажность (%)	< 8
Жизнеспособные клетки САСД (КОЕ/г)	≥ 1,2.10 ¹⁰
Молочнокислые бактерии (КОЕ/г)	< 10 ⁵
Уксуснокислые бактерии (КОЕ/г)	< 10 ⁴
Дрожжи другого рода, нежели <i>Saccharomyces</i> (КОЕ/г)	< 10 ⁵
Дрожжи другого вида или штамма (%)	< 5
Колиформные бактерии (КОЕ/г)	< 10 ²

Кишечная палочка (/г)	отсутствует
Стафилококк (/г)	отсутствует
Сальмонелла(/25 г)	отсутствует
Плесневые грибы (КОЕ/г)	< 10 ³
Свинец (ppm)	< 2
Мышьяк (ppm)	< 3
Ртуть (ppm)	< 1
Кадмий (ppm)	< 1



LAFFORT

l'œnologie par nature

ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- Инокулируйте дрожжи как можно быстрее после регидратации.
- Соблюдайте рекомендованную дозировку для гарантии хорошего развития штамма, даже при обилии «диких» дрожжей.
- Температура, штамм, регидратация и гигиена на винодельне имеют решающее значение для успешного брожения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Инокуляция с регидратацией

- Строго соблюдайте протокол регидратации.
- Избегайте разницы температуры более чем на 10°C между суслом и разводкой дрожжей во время инокуляции. Общее время подготовки разводки дрожжей не должно превышать 45 минут.
- При особо сложных условиях брожения (низкая температура, сильно осветленное сусло, высокое потенциальное содержание спирта) добавьте SUPERSTART® в воду, для регидратации.

Прямая инокуляция:

- Чтобы облегчить внесение, растворите дрожжи в воде комнатной температуры.
- Хорошо перемешайте после инокуляции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

- Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте без посторонних запахов, при умеренной температуре.
- Срок хранения: 4 года.

ДОЗИРОВКА

- **Инокуляция с регидратацией:**
20-30 г/л (в зависимости от характеристик сусла и условий винификации).
- В случае остановки брожения, без регидратации:
30-50 г/л.

УПАКОВКА

Вакуумные пакеты 500 г. Коробка 10 кг (20 x 500 г).
Пакет 10 кг.

