

# ACTIFLORE® F5

Дрожжи, рекомендованные для выработки виноматериалов, предназначенных для дистилляции. *Селекционированные активные сухие дрожжи (САСД) – без ГМО, для использования в виноделии. Разрешены для применения в производстве пищевых продуктов, в рамках регламентированного использования в виноделии. Соответствуют Регламенту ЕС № 2019/934.*

## ОПИСАНИЕ И ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дрожжи селекционированные из-за их способности производить небольшое количество высших спиртов, этанола, этилацетата.

- Превосходная ферментационная способность, короткая лаг-фаза.
- Средняя потребность в азоте.
- Низкое производство SO<sub>2</sub>.

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обезвоженные дрожжи в вакуумной упаковке.

Форма ..... гранулы

## ХИМИЧЕСКИЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Влажность (%) ..... < 8  
 Жизнеспособные клетки САСД (КОЕ/г) .....  $\geq 2.10^{10}$   
 Молочнокислые бактерии (КОЕ/г) ..... < 10<sup>5</sup>  
 Уксуснокислые бактерии (КОЕ/г) ..... < 10<sup>4</sup>  
 Дрожжи другого рода, нежели  
*Saccharomyces* (КОЕ/г) ..... < 10<sup>5</sup>  
 Дрожжи другого вида или штамма (%) ..... < 5  
 Колиформные бактерии (КОЕ/г) ..... < 10<sup>2</sup>

*Кишечная палочка* /г ..... отсутствует  
*Стафилококк* /г ..... отсутствует  
*Сальмонелла* / 25 г ..... отсутствует  
 Плесневые грибы (КОЕ/г) ..... < 10<sup>3</sup>  
 Свинец (ppm) ..... < 2  
 Мышьяк (ppm) ..... < 3  
 Ртуть (ppm) ..... < 1  
 Кадмий (ppm) ..... < 1

## ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ

### ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- Используйте сразу после приготовления
- Соблюдайте рекомендованную дозировку, чтобы гарантировать хорошую приживаемость, даже в случае высокой популяции «диких» дрожжей.
- Температура, штамм дрожжей, регидратация и гигиена на винодельне также важны для хорошей приживаемости.

### ДОЗИРОВКА

- 20 - 30 г/гл (в зависимости от характеристик сусле и условий винификации).



**LAFFORT**

*l'œnologie par nature*

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Строго соблюдайте протокол регидратации.
- Избегайте разницы температуры более чем на 10°C между суслом и разводкой дрожжей во время инокуляции. Общее время подготовки разводки дрожжей не должно превышать 45 минут.
- В случае сложных условий брожения (низкая температура, сильно осветлённое сусло, потенциально высокое содержания спирта) добавьте SUPERSTART® BLANC или SUPERSTART® ROUGE в воду для регидратации.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

- Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте без посторонних запахов, при умеренной температуре.
- Срок хранения: 4 года.

## УПАКОВКА

Вакуумные пакеты 500 г. Коробка 10 кг.

