


# INOCULACIÓN DE LA GAMA LACTOENOS®

## INOCULACIÓN DIRECTA

LACTOENOS® DIRECT



Atempere el sobre 30 minutos antes de la inoculación



Homogeneizar


- Co-inoculación precoz  
24 – 48 horas después del inicio de la FA (16°C - 30°C).
- Co-inoculación tardía  
1010 de densidad (< 26°C).
- Inoculación secuencial  
Después de la FA, en el trasiego (20°C - 22°C).
- Inoculación curativa  
(20°C - 22°C).

## INOCULACIÓN CON ACLIMATACIÓN

LACTOENOS® PREAC

### CO-INOCULACIÓN PRECOZ


Fase de aclimatación



H<sub>2</sub>O no clorada (1L)  
+ Mosto (1L)




30 minutos



50 hL  
Homogeneizar

### CO-INOCULACIÓN TARDÍA o INOCULACIÓN SECUENCIAL


Fase de aclimatación



H<sub>2</sub>O no clorada (1L)  
+ Vino (1L)



12 horas



50 hL  
Homogeneizar



### Para saber más

Descubra nuestro protocolo Re-activación de la fermentación maloláctica (FML) en nuestra sección LAFFORT & YOU.



**LAFFORT**

*l'œnologie par nature*