


INOCULATION GAMME LACTOENOS®

LACTOENOS® DIRECT

INOCULATION DIRECTE

Direct

Sortir le sachet 30 min. avant inoculation



Homogénéiser

- Co-inoculation précoce
24 - 48 h après le départ de la FA.
(16°C - 30°C)
- Co-inoculation tardive
1.010 de densité (<26°C).
- Inoculation séquentielle
Après la FA, à l'écoulage (20°C - 22°C).
- Inoculation curative
(20°C - 22°C)

LACTOENOS® PREAC

INOCULATION AVEC ACCLIMATATION

CO-INOCULATION PRÉCOCE

Phase de préparation

PreAc +
Energizer



20°C




H₂O non chlorée (1L)
+ Moût (1L)



30 minutes



16°C - 30°C



50 hL
Homogénéiser

CO-INOCULATION TARDIVE ou INOCULATION SÉQUENTIELLE

Phase d'acclimatation

PreAc +
Energizer



20°C




H₂O non chlorée (1L)
+ Vin (1L)



12 heures



< 26°C



50 hL
Homogénéiser



En savoir plus

Découvrez notre protocole REPRISE DE LA FML sur notre site internet, rubrique LAFFORT & YOU.



LAFFORT

l'œnologie par nature